

Звіт
про основні показники наукової діяльності
у III кварталі 2026 року

№ п/п	Назва кафедри	Найменування завдання, виконавець	Термін виконання завдання, виконавець	Наукові результати виконання завдання
1	2	3	4	5
1.	Кафедра нервових хвороб	«Роль порушень сну та циркадного ритму у діагностиці, прогнозуванні перебігу, реабілітації та комплексному лікуванні розладів психіки та захворювань нервової системи» № держреєстрації 0124U000094 Підрозділ, що виконує НДР: кафедра нервових хвороб; кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Керівники НДР: Проф.Дельва Михайло Юрійович Проф. Скрипников Андрій Миколайович	2024-2028 Доц. Бойко Д.І., Асист. Шкодін А.Д.	4
2.	Кафедра нервових хвороб	«Нейропсихологічні особливості больових феноменів при органічних ураженнях нервової системи та психіки внаслідок бойових дій» № держреєстрації 0124U003351 Підрозділ, що виконує НДР: кафедра нервових хвороб; кафедра психіатрії, наркології та медичної психології	2024-2028 Доц. Гринь К.В.	

		Керівники НДР: Проф.Дельва Михайло Юрійович Проф. Скрипніков Андрій Миколайович		
--	--	---	--	--

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
1	2	3	4	5
Провести диференційну діагностику атипового паркінсонізму на основі консенсусних міжнародних критеріїв на прикладі клінічного випадку деменції з тільцями Леві.	Petrashevskaya Y., Shkodina A., Delva M. Dementia with Lewy bodies: a clinical case study on the differential diagnosis of atypical parkinsonism. The Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2026. Vol. 163, No. 2. P. 91–98. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(163).2026.91-98	8	Вивчити диференційнодіагностичні критерії атипового паркінсонізму та продемонструвати діагностичний і терапевтичний процес на клінічному випадку деменції з тільцями Леві.	Пацієнту 75 років спочатку встановлено діагноз мульти-системної атрофії паркінсонічного підтипу (олігобрадикінезія, пластична гіпертонія, атаксія кінцівок, погана відповідь на леводопа-тест). Виявлення рецидивних когнітивних флуктуацій (MMSE 19–20 балів) та персистуючих зорових галюцинацій, що є критеріями виключення мультисистемної атрофії, зумовило перегляд діагнозу: встановлено клінічно вірогідну деменцію з тільцями Леві з усіма чотирма основними ознаками.
Висвітлити ведення деменції з тільцями Леві шляхом корекції як рухових симптомів, так і когнітивного зниження для	Шкодін А.Д., Петрашевська Ю.В., Мельник Л.М., Криворучко І.Г., Дельва М.Ю. Amantadine combined with	4	Вивчити особливості лікування деменції з тільцями Леві з урахуванням	Описано пацієнта 75 років, який звернувся після падіння з гострим больовим синдромом, вираженою

збереження якості життя та здатності до самообслуговування (клінічний випадок).	extended-release levodopa for the management of motor symptoms in dementia with Lewy bodies: a case report. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2026. Т. 26, вип. 2. С. 367–370.		обмеженої відповіді на дофамінергічну терапію та ризику посилення галюцинацій.	м'язовою ригідністю та неможливістю самостійно рухатися. Неврологічно виявлено ознаки паркінсонізму та мозочкової дисфункції; за анамнезом — рецидивні зорові галюцинації, розлад поведінки у фазі швидкого сну та автономна дисфункція. У процесі диференційної діагностики схему лікування кілька разів коригували з урахуванням побічних ефектів та ефективності доз.
Узагальнити сучасні дані щодо механізмів та індукторів NETозу, ролі нейтрофільних позаклітинних пасток (NETs) при інфекціях і захворюваннях та їх діагностичного і прогностичного значення.	Nasir M.H., Rehman A.U., Yusoff M.B., Ishaq M., Alkhateeb A., Shkodina A.D. та ін. Neutrophil extracellular traps (NETs) extrusion in infection and diseases: A hallway for diagnosis and prognosis. European Journal of Pharmacology. 2026. Art. 178822. (Scopus, Q1)		Проаналізувати механізми утворення NETs, індуктори та типи NETозу при інфекціях, а також наслідки їх активації для перебігу захворювань.	Показано, що NETs беруть участь у патогенезі інфекцій, аутоімунних, судинно-оклюзійних, серцево-судинних, легеневих, метаболічних та онкологічних захворювань і мають подвійний (як захисний, так і патогенний) вплив. Накопичення NETs та порушення їх кліренсу сприяють патогенезу і розвитку тяжких форм інфекції.
Оцінити прогностичне значення алекситимії щодо ризику розвитку розладу адаптації серед студентів, які	Boiko D.I., Mats O.V., Chernov A.A., Atamanchuk N.M., Yalanska S.P., Sokolenko V.M., Shkodina A.D. The		Визначити прогностичну значущість алекситимії та її окремих	Алекситимію виявлено у 41,3% учасників; вона частіше траплялася серед жінок (44,9% проти 25,6%; $p <$

продовжують очне навчання в умовах повномасштабної війни.	predictive role of alexithymia in the development of students' maladaptation during the first year of the Russian–Ukrainian war. Australasian Psychiatry. 2026. https://doi.org/10.1177/10398562261440787 (Scopus, Q3)	субшкал щодо ризику розладу адаптації у студентів в умовах повномасштабної війни.	0,001) та в групі розладу адаптації (54,4% проти 27,6%; $p < 0,001$). Складність ідентифікації почуттів найсильніше корелювала з показниками розладу адаптації ($r = 0,460$) та була єдиним значущим предиктором у багатофакторній моделі ($OR = 1,14$; 95% ДІ 1,097–1,19). Результати обґрунтовують доцільність скринінгу алекситимії та розвитку емоційної грамотності як захисного чинника.
---	--	---	---

Завідувач кафедри нервових хвороб
професор

Михайло ДЕЛЬВА